

HERBICIDE
PRÉSEMI, PRÉLEVÉE
POSTLEVÉEGroupe 4
Groupe 9MULTI
MODE
D'ACTIONL'HERBICIDE ENLIST DUO AVEC LA TECHNOLOGIE COLEX-D,
DIRECTIVES D'APPLICATION

avec la technologie COLEX-D™

HERBICIDE

L'herbicide Enlist Duo™ avec la technologie COLEX-D™ fournit la commodité du 2,4 – D choline et du glyphosate en une seule préparation pour lutter contre les mauvaises herbes (graminées et feuilles larges) y compris celles qui sont difficiles à supprimer et résistantes.

POURQUOI UTILISER L'HERBICIDE ENLIST DUO?

- Une suppression améliorée grâce à deux modes d'action : Groupes 4 et 9
- Plusieurs modes d'action dans une formulation pratique
- Stabilité améliorée en cuve pour une bouillie qui reste mélangée
- La solution de pulvérisation n'adhère pas aux composants du pulvérisateur
Cela permet un nettoyage facile et rapide du pulvérisateur

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES

Soyas Enlist E3™
(1,74 L/ac)

- Absinthe biannuelle²
- Abutilon
- Amarante tuberculée commune
- Amarante de Powell
- Amarante à racines rouges
- Amarante de Palmer³
- Amarante de Russie
- Asclépiade commune^{3,4}
- Barbe-de-bouc
- Bardane
(avant la 4^e feuille)
- Bardane²
- Bardanette épineuse
- Blé spontané
- Bourse à pasteur
- Brocoli sauvage
- Caméline faux-lin
- Canola spontané¹
- Céraiste vulgaire
- Chardon des champs^{3,5}
- Chénopode blanc
- Chénopode glauque
- Chiendent
- Crépis-des-toits, feuilles étroites

- Digitale glabre
- Digitale sanguine
- Échinochloa pied-de-coq
- Euphorbe érule²
- Folle avoine
- Gaillet grateron, commun
- Galinsoga cilié
- Herbe à poux géante
- Kochia
- Laiteron des champs
- Laiteron potager vivace^{3,5}
- Laiteron potager
- Laitue scariole²
- Lampourde
- Lépidie densiflore
- Liseron des champs³
- Liseron des haies
- Matricaire odorante
- Mauve à feuilles rondes³
- Millet commun
- Morelle noire de l'est en fleur
- Moutarde des chiens
- Moutardes
(sauf la verte tanaïs)
- Orge spontanée
- Ortie royale
- Panic d'automne

- Pissenlit
- Plantain commun
- Pourpier commun
- Prêle des champs
- Radis sauvage
- Renouée
- Renouée (avant la 4^e feuille)
- Renouée de Pennsylvanie
- Renouée persicaire
- Renouée scabre
- Sagesse-des-chirurgiens
- Saponaire des vaches
- Sarrasin de Tartarie
- Sarrasin sauvage
- Sétaire géante et verte
- Silène noctiflore
- Souchet comestible^{3,6}
- Soude roulante
- Spargoute
- Stellaire moyenne
- Tabouret des champs
- Tanaïs vulgaire
- Tomate sauvage
- Tournesol annuel
- Trèfle sucré
- Vergerette annuelle
- Vergerette du Canada
- Vesce

Maïs grain
Enlist™Soyas
Enlist E3™

CULTURES

Maïs grain Enlist™

Soyas Enlist E3™

Brûlage en
présemis avant le
maïs grain,
le blé (de
printemps,
d'hiver, blé dur),
orge, seigle.

DOSES ET SUPERFICIES TRAITÉES

Doses :

Maïs grain Enlist™
et soya Enlist E3™ :

- 1,18 à 1,74 L/ac

Brûlage en présemis avant le maïs grain,
le blé (de printemps, d'hiver, blé dur),
orge, seigle.

- 0,89 à 1,74 L/ac

Superficie traitée (dose 1,74 L/ac) :

- 10 ac/caisse
- 320 ac/réservoir

Volume d'eau :

- 10 à 15 gal É.-U./ac

- Ne pas dépasser plus de 3,48 litres/ac par saison.

EMBALLAGE

Caisse :

- 2 cruches de
8,7 L chacune

Réservoir :

- 556,8 L

QUAND L'APPLIQUER?

Stade de la culture :

- Maïs Enlist™ : Jusqu'au stade de croissance V8 ou 120 cm (48") de haut.
- Les soya Enlist E3™ : Jusqu'à au plus tard le stade R2 ou au stade pleine floraison.
- Brûlage en présemis, avant le maïs grain ou les cultures céréalières : Avant ou après le semis, mais avant la levée de la culture.

RÉSISTANCE AU LESSIVAGE PAR LA PLUIE

- 2 heures

HERBICIDE POUR MÉLANGES EN RÉSERVOIR

Veuillez consulter le Guide d'utilisation des produits Enlist disponible à EnlistCanada.ca.

Information concernant l'application

Exigences en matière d'application ciblée :

Taille des gouttelettes : Grossière à extrêmement grossière (norme ASAE S-572) pour réduire considérablement le potentiel de dérive.

Hauteur de la rampe : 60 cm ou moins

Volume de vaporisation : 10 à 15 gal/ac est optimal

Le vent : 3 à 16 km/h, ne pas pulvériser pendant une inversion de température. Ne pas pulvériser sous des vents qui dépassent 25 km/h.

Maïs Enlist, Soya Enlist E3 : Faites 1 à 2 application(s) séparées d'au moins douze jours.

Rotation des cultures

Toutes les cultures peuvent être cultivées l'année suivant une application d'Enlist Duo.

Délai avant récolte (DAR)

Soyas Enlist E3 : Ne pas récolter pour le fourrage ou le foin. Ne pas offrir en pâturage le soya traité avec Enlist E3.

Maïs Enlist™ : Ne pas permettre aux animaux laitiers en lactation de paître dans les champs pour 7 jours suivants l'application.

Ne pas récolter le fourrage ou couper le foin dans les 30 jours suivant l'application. Retirer les bovins de boucherie des champs traités au moins trois jours avant l'abattage.

¹ Y compris les variétés de soya tolérantes au glyphosate et le canola Clearfield®.

² Suppression partie aérienne seulement.

³ Utiliser 2 applications pour une meilleure suppression. La seconde application ne devrait être pas plus tard que le stade R2 (pleine floraison) du soya.

⁴ L'asclépiade : 15 à 60 cm de hauteur et en croissance active.

⁵ Chardon des champs, du Canada et laiteron des champs, vivaces : application du stade de la rosette à 50 cm de hauteur et en croissance active.

⁶ Souchet comestible : 5 à 15 cm de hauteur et en croissance active.